

Appendice D

Integrale della gaussiana

Tabella dei valori dell'integrale:

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

<i>z</i>	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999

Questa tabella è stata generata con la funzione NORMDIST di OPENOFFICE.

D.1 Uso della tabella dell'integrale della gaussiana

La tabella precedente dà direttamente il valore di $\Phi(z)$ per $z > 0$. Per $z < 0$, osservando che la distribuzione normale $\mathcal{N}(0, 1)$ è simmetrica, possiamo scrivere la relazione:

$$\text{per } z < 0 \quad \Phi(z) = 1 - \Phi(-z) \quad (\text{D.1})$$

Ad esempio volendo il valore di $\Phi(-1.37)$ si determina $\Phi(1.37) = 0.9147$, valore che si trova all'incrocio della riga indicata da 1.3 e della colonna indicata con 0.07. Infine, usando la (D.1), si ottiene:

$$\Phi(-1.37) = 1 - 0.9147 = 0.0853$$

Se è necessario ottenere $\Phi(z)$ per un valore z_o che non compare nella tabella si può utilizzare il metodo dell'interpolazione lineare dei dati.

Interpolazione lineare dei dati in una tabella. L'interpolazione lineare permette di riempire i "buchi" in una tabella di dati x_i, y_i , supponendo che esista una relazione lineare tra y e x .

La figura D.1 mostra l'uso dell'interpolazione lineare tra due punti (x_1, y_1) e (x_2, y_2) nel caso in cui si voglia determinare quale sia il valore y_o che corrisponde ad un valore di x_o intermedio tra x_1 e x_2 . Utilizzando l'equazione della retta per due punti si ottiene:

$$y_o = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_o - x_1) + y_1$$

Applicando questa relazione alla tabella dell'integrale della distribuzione normale standardizzata per ottenere $\Phi(z_o)$. Scegliamo nella tabella due valori contigui z_i e z_{i+1} in modo che $z_i < z_o < z_{i+1}$, otteniamo:

$$\Phi(z_o) = \frac{\Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)}{z_{i+1} - z_i}(z_o - z_i) + \Phi(z_i)$$




Figura D.1: Interpolazione lineare